

Hello! FUJISEI

No.265

世界有数の高齢社会となっている日本ですが、厚生労働省の「平成26年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は、男性が80.50年、女性が86.83年でした。

生命表の上で、ある年齢の人が将来どの死因で死亡するかを計算し、確率の形で表したものを「死因別死亡確率」（実際の死亡数とは異なります）といいます。

昭和56年から死因第1位を続けるがん（悪性新生物）ですが、死因別死亡確率は、0歳では男女ともがんが最も高く、以下、男性は心疾患、肺炎、脳血管疾患、女性は心疾患、脳血管疾患、肺炎の順になっています。65歳では0歳に比べ、がんの死亡確率は少し低くなり、他の死亡確率が高くなります。しかし、男性は、年齢にかかわらずがんの死亡確率が

3大死因が克服で寿命は6～7年延びる

生涯を通じて “がん” は怖い病気

高く、生涯を通じてもっとも怖い病気であるといえます。均寿命は男性7.28年、女性6.02年延びます。

また、男性では、0歳、65歳で、3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）の死亡確率は5割を超えています。

ある死因が克服されたと仮定すると、死亡時期の繰り延べが生じ、余命が延びることになります。この延びは、その死因のために失われた余命と考えられ、これらによって各死因が平均余命に与える影響の大きさを測ることができます。

がんを除去すると、平均寿命は、男性3.80年、女性2.94年延びます。がん、心疾患および脳血管疾患の3大死因を除去した場合、平


特定死因を除去した場合の平均余命の延び（主要死因）

（単位：年）

主要死因	年齢	男	女
悪性新生物	0歳	3.80	2.94
	65	3.02	2.00
	75	2.03	1.38
	90	0.58	0.42
心疾患 (高血圧性を除く)	0歳	1.46	1.42
	65	1.13	1.34
	75	0.95	1.27
	90	0.62	0.87
脳血管疾患	0歳	0.82	0.80
	65	0.65	0.72
	75	0.56	0.66
	90	0.29	0.41
肺炎	0歳	0.83	0.66
	65	0.84	0.65
	75	0.84	0.64
	90	0.65	0.48
悪性新生物、 心疾患及び 脳血管疾患	0歳	7.28	6.02
	65	5.88	4.83
	75	4.41	3.99
	90	1.89	2.07

死因別死亡確率（主要死因）

厚生労働省「平成26年簡易生命表」より



AIG富士生命保険株式会社

〒105-8633 東京都港区虎ノ門4-3-20
神谷町MTビル